

ইনডোরেস্ক

ইনডোমেটাসিন বিপি ২৫ মি. গ্রা.

INDOREX

Indomethacin BP 25 mg

বর্ণনাঃ

ইনডোরেস্ক হল ইনডোমেটাসিন এর একটি প্রস্তুতি। ইনডোমেটাসিন একটি নন-স্টেরয়েডাল অ্যান্টিইনফ্ল্যামেটরি ইন্ডোল ডেরিভেটিভ যা অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি এবং অ্যানালজেসিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এর কর্ম প্রক্রিয়াটি মূলত প্রোস্টাগ্যান্ডিন সংশ্লেষণ প্রতিরোধের উপর ভিত্তি করে হয়। ইনডোমেটাসিন অন্তর্নিহিত রোগের প্রগতিশীল কোর্সকে পরিবর্তন করে না।

উপস্থাপনাঃ

ইনডোরেস্ক-২৫ ক্যাপসুল: প্রতিটি ক্যাপসুলে ইনডোমেথাসিন বিপি ২৫ মিলিগ্রাম থাকে।

নির্দেশনাঃ

- * মাঝারী থেকে তীব্র রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস।
- * মাঝারী থেকে তীব্র অক্ষীয় কঙ্কালতন্ত্রের বাতজনিত ব্যাধি।
- * মাঝারী থেকে তীব্র হাড়ের বাতজনিত ব্যাধি।
- * তীব্র ঘাড় ব্যাথা।
- * তীব্র বাতজনিত ব্যাধি।

সেবনবিধি ও বিধিঃ

প্রাণ্ডবয়স্ক

বাতজনিত রোগঃ পৃথক মাত্রায় প্রতিদিন ৫০-২০০ মি.গ্রা.।

তীব্র গাউটঃ পৃথক মাত্রায় প্রতিদিন ১৫০-২০০ মি.গ্রা.।

নারীদের মাসিকজনিত ব্যাথাঃ প্রতিদিন সর্বোচ্চ ৭৫ মি.গ্রা. পর্যন্ত।

অপ্রাণ্ডবয়স্ক

১৪ বছর বয়সী পেডিয়াট্রিক রোগীদের জন্য সুরক্ষিত ও কার্যকরী এবং এর থেকে কনিষ্ঠ রোগীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত নয়।

যে কোনও এনএসএআইডি রোগের মতো, বয়স্কদের (৬৫ বছর বা তার বেশী) চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, কারণ বয়স বৃদ্ধির ফলে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনাও বাড়তে দেখা যায়।

গর্ভাবস্থা এবং সন্ধানানের ক্ষেত্রেঃ

গর্ভাবস্থা ক্যাটাগরি সি। গর্ভকালীন সময়ে ইনডোমেটাসিন ব্যবহার করা যেতে পারে যদিও সম্ভাব্য সুবিধাবলি মূত্রের সম্ভাব্য ঝুঁকিকে ন্যায়সংগত করে তোলে। দুগ্ধদানকারী মায়েরদের দুধের মাধ্যমে ইনডোমেটাসিন নির্গত হয়। নার্সিং মায়েরদের ব্যবহারের জন্য ইনডোমেটাসিন পরামর্শ করা হয় না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াঃ

ইনডোমেটাসিন এর সবচেয়ে সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া গুলো হল বমি বমি ভাব, ডিসপ্যাপসিয়া, ডায়রিয়া, এপিগাস্ট্রিক এবং পেটে ব্যাথা, কোষ্ঠকাঠিন্য, মাথা ব্যাথা, মাথা ঘোরা, ভার্টিগো, অবসন্নতা এবং তিনিতাস।

প্রতিনির্দেশনাঃ

ইনডোমেটাসিন সেসকল রোগীদের উপর নির্দেশিত নয় যাদের মধ্যে হাইড্রোমেটাসিন কিংবা এ জাতীয় উপাদানের সান্নিধ্যে হাইপার সেনসিটিভিটি দেখা মেয়। আর্সপিরিন বা অন্যান্য এনএসএআইডি মেওয়ার পরে হাঁপানি, মূত্রাশয় বা অ্যালার্জি জাতীয় প্রতিক্রিয়া আছে এমন রোগীদের ইনডোমেটাসিন দেওয়া উচিত নয়। ইনডোমেটাসিন করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফট (সিএবিজি) সার্জারির ক্ষেত্রে প্রি-অপারেটিভ ব্যথার চিকিৎসার জন্যও নির্দেশিত নয়।

সতর্কতাঃ

অল্পের ক্ষত রোগ, হাঁপানি বা অ্যালার্জিকজনিত রোগ, রেনাল এবং হেপাটিক ক্রিয়াকলাপসহ রোগীদের যত্ন সহকারে ইনডোমেটাসিন ব্যবহার করা উচিত।

ড্রাগ ইন্টারাকশনঃ

ইনডোরেস্ক যেসকল ড্রাগস এর সাথে ইন্টারেক্ট করে তারা হল এসিই ইনহিবিটর এবং অ্যাঞ্জিওটেনসিন টু এন্টাগনিস্ট, অ্যাসপিরিন, বিটা- অ্যাড্রেনোরেসপ্টর ব্লকিং এজেন্টস, সাইক্লোস্পোরিন, ডিফ্লুনিসাল, ডিগোক্সিন, ডায়ুরিটিক্স, লিথিয়াম, মেথোট্রেয়েট, ওরাল অ্যান্টিকোয়াল্যান্ড্যান্টস এবং প্রোবেনেসিড।

মাত্রাধিকঃ

ইনডোমেটাসিন মাত্রাধিকের লক্ষণগুলি হল বমি বমি ভাব, তীব্র মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা, মাসিক বিস্মৃতি বিচ্ছিন্নতা বা অবসন্নতা, প্যারাডেলিসিয়াস, অসাড়তা এবং যিচুনি। অতিরিক্ত মাত্রার চিকিৎসায় লক্ষণীয় এবং সহায়ক। সাম্প্রতিক ওভারডোজ হলে পেটটি যত তাড়াতাড়ি স্তব্ধ খালি করা উচিত। রোগীর অবস্থার উপর নির্ভর করে, নিবিড় চিকিৎসা পর্যবেক্ষণ এবং নার্সিংয়ের যত্নের প্রয়োজন হতে পারে।

ফার্মাসিউটিক্যাল সতর্কতাঃ

- * আলো থেকে সুরক্ষিত একটি শীতল এবং শুকনো জায়গায় রাখুন।
- * শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

বাণিজ্যিক মোডেলঃ

ইনডোরেস্ক-২৫ ক্যাপসুল : প্রতি বক্সে রয়েছে ১০x১৫ টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার স্ট্রিপে।

Description

Indorex is a preparation of Indomethacin. Indomethacin is a non-steroidal anti-inflammatory indole derivative with anti-inflammatory and analgesic properties. Its mechanism of action is largely based on inhibition of prostaglandin synthesis. Indomethacin affords relief of symptoms; it does not alter the progressive course of the underlying disease.

Presentation

Indorex 25 capsule: Each capsule contains Indomethacin BP 25 mg.

Indications

Moderate to severe rheumatoid arthritis including acute flares of chronic diseases.

- Moderate to severe ankylosing spondylitis.
- Moderate to severe osteoarthritis.
- Acute painful shoulder (bursitis & tendinitis)
- Acute gouty arthritis

Dosage and administration

Adult

Rheumatic diseases : 50-200 mg daily in divided doses.

Acute gout : 150-200 mg daily in divided doses.

Dysmenorrhea : up to 75 mg daily.

Children

Safety and effectiveness in pediatric patients 14 years of age and younger have not been established.

As with any NSAID, caution should be exercised in treating the elderly (65 years and older) since advancing age appears to increase the possibility of adverse reactions.

Use in pregnancy and lactation

Pregnancy category C. Indomethacin should be used during pregnancy only if the potential benefit justifies the potential risk to fetus. Indomethacin is excreted in the milk of lactating mothers. Indomethacin is not recommended for use in nursing mothers.

Side effects

The most common side effects of Indomethacin are nausea, vomiting, dyspepsia, diarrhea, epigastric & abdominal pain, constipation, headache, dizziness, vertigo, bmnolence, depression fatigue & tinnitus.

Contraindications

Indomethacin is contraindicated in patients with known hypersensitivity to Indomethacin or to any of the components of the product. Indomethacin should not be given to patients who have experienced asthma, urticaria, or allergic-type reactions after taking aspirin or other NSAIDs. Severe, rarely fatal, anaphylactoid/anaphylactoid reactions to NSAIDs have been reported in such patients. Indomethacin is also contraindicated for the treatment of pre-operative pain in the setting of coronary artery bypass graft (CABG) surgery.

Precautions

Indomethacin should be used with care in patients with a history of GI disease, asthma, or allergic disease, impaired renal & hepatic function.

Drug interactions

Indomethacin may interact with ACE inhibitors and angiotensin II antagonists, Aspirin, Beta-Adrenoreceptor Blocking agents, Cyclosporin, Diflunisal, Digoxin, Diuretics, Lithium, Methotrexate, Oral anticoagulants & Probenecid.

Overdose

The symptoms of overdose are nausea, vomiting, intense headache, dizziness, mental confusion, disorientation, or lethargy, paresthesias, numbness and convulsions. Treatment of overdose is symptomatic and supportive. The stomach should be emptied as quickly as possible if the ingestion is recent. Depending on the condition of the patient, close medical observation and nursing care may be required.

Pharmaceutical precautions

- Store in a cool and dry place protected from light.
- Keep out of the reach of children.

Commercial Pack

Indorex-25 capsule: Each box contains 10x15 tablets in blister strip.



প্রস্তুতকারক :
মেডিমেট ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ
রূপাতলী, বরিশাল, বাংলাদেশ।



Manufactured by:
MEDIMET Pharmaceuticals Ltd.
Rupatali, Barishal, Bangladesh.