

Omeazole Insert Layout

Size : W-88 mm, H-240 mm



ওমেপ্রাজল বিপি

উপাদান

ওমেপ্রাজল ২০ ক্যাপসুল : প্রতি ক্যাপসুলে আছে ওমেপ্রাজল বিপি ২০ মি.গ্রা. এন্টেরিক কোটেড পিলেট হিসাবে।

ওমেপ্রাজল ৪০ ক্যাপসুল : প্রতি ক্যাপসুলে আছে ওমেপ্রাজল বিপি ৪০ মি.গ্রা. এন্টেরিক কোটেড পিলেট হিসাবে।

নির্দেশনা

বিনাহিন (মারাত্মক নয় এমন) গ্যাস্ট্রিক ও ডিওডেনাল আলসার, নন-স্টেরয়ডাল প্রদাহরোধী ওষুধ দ্বারা চিকিৎসার ফলে সৃষ্ট জটিলতা, ইরোসিভ রিফ্লাক্স ইসোসেফগাইটিস এবং অত্যধিক গ্যাস্ট্রিক এসিড নিঃসরণ জনিত জটিলতা যেমন জোলিঞ্জার-এলিসন সিনড্রোম।

সেবনবিধি ও মাত্রা

ওমেপ্রাজল এর মাত্রা ও সেবনবিধি			
নির্দেশনা	মাত্রা	ফ্রিকুয়েন্সি	
নন-স্টেরয়ডাল সম্পর্কিত ডিওডেনাল বা গ্যাস্ট্রিক আলসার	২০ মি.গ্রা.	প্রতিদিন একবার করে ৪ সপ্তাহ	
গ্যাস্ট্রোইসোসেফাজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ	২০ মি.গ্রা.	প্রতিদিন একবার করে ৪ সপ্তাহ	
দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাপনা এসিড রিফ্লাক্স ডিজিজ	৪০ মি.গ্রা.	প্রতিদিন একবার করে ৪ সপ্তাহ**	
গ্যাস্ট্রিক এবং ডিওডেনাল আলসার নিরাময়	৪০ মি.গ্রা.	প্রতিদিন একবার করে ৪ সপ্তাহ**	

অনুপযোগিতা এবং সাবধানতা

ওমেপ্রাজল ব্যবহারে কোন অনুপযোগিতা জানা নেই। যখন গ্যাস্ট্রিক আলসার ধারণা করা হয় তখন ওমেপ্রাজল দ্বারা চিকিৎসা শুরু করার পূর্বে ম্যালিগনেসি আছে কিনা পরীক্ষা করা উচিত কারণ ওমেপ্রাজল ম্যালিগনেসির লক্ষণসমূহ উপসম করতে পারে ফলে ম্যালিগনেসি নির্ণয়ে বিলম্ব ঘটতে পারে।

সতর্কতা

ওমেপ্রাজল দ্বারা আলসার লক্ষণ সমূহ দূরীভূত হলেও ম্যালিগনেসি অনুপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে না।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া

ওমেপ্রাজল সু-সহনীয়। মূদু এবং অস্থায়ী পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে বমি বমি ভাব, ডায়রিয়া, তলপেটে ব্যথা, অস্বস্তিবোধ, মাথা বিম বিম করা এবং মাথা ব্যথা। এই ক্ষেত্রে সেবন মাত্রা কমানোর প্রয়োজন নেই।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার

অন্য কোন নিরাপদ ওষুধ থাকলে গর্ভাবস্থায় এই ওষুধ পরিহার করা উচিত। যদি ওমেপ্রাজল এর ব্যবহার অতি প্রয়োজনীয় হয় তাহলে স্তন্য দানে বিরত থাকতে হবে।

ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন

ওমেপ্রাজল ব্যবহারের সময় ডায়াজিপাম, ফেনিটয়িন এবং ওয়ারফারিন এর নিঃসরণ বিলম্বিত হয়। যখন ওমেপ্রাজল চিকিৎসায় যুক্ত হয় তখন ওয়ারফারিন এবং ফেনিটয়িন-এর মাত্রা কমানোর প্রয়োজন হয়। থিউফাইলিন, প্রোপ্রানোলল অথবা এন্টাসিড-এর সাথে ওমেপ্রাজল-এর ইন্টারঅ্যাকশনের কোন প্রমাণ নেই।

সংরক্ষণ

আলো থেকে দূরে, ঠান্ডা (৩০° সে. তাপমাত্রার নিচে) ও শুষ্ক স্থানে সংরক্ষণ করুন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহ

ওমেপ্রাজল ২০ ক্যাপসুল : প্রতি বাক্সে আছে ১০ x ১০ টি ক্যাপসুল ব্লিষ্টার স্ট্রিপে।
ওমেপ্রাজল ৪০ ক্যাপসুল : প্রতি বাক্সে আছে ৪ x ১০ টি ক্যাপসুল ব্লিষ্টার স্ট্রিপে।



প্রস্তুতকারক :
মেডিমেট ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ
রূপাতলী, বরিশাল, বাংলাদেশ।



Omeprazole BP

COMPOSITION

Omeazole 20 Capsule: Each capsule contains Omeprazole BP 20 mg as enteric coated pellets.

Omeazole 40 Capsule: Each capsule contains Omeprazole BP 40 mg as enteric coated pellets.

INDICATIONS

Benign gastric and duodenal ulcers including those complicating NSAID therapy, erosive reflux oesophagitis and for disorders associated with hypersecretion of gastric acid, such as the Zollinger-Ellison syndrome.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

Omeazole dosing recommendations		
Indication	Recommended dose	Frequency
NSAID- associated duodenal or gastric ulcer	20 mg	Once daily 4 week
Gastro Esophageal reflux disease	20 mg	Once daily 4 week
Long term management of acid reflux	40 mg	Once daily 4 week**
Gastric and duodenal ulcer	40 mg	Once daily 4 week**

CONTRAINDICATION AND WARNING

There are no known contraindications to the use of Omeazole. When gastric ulcer is suspected, the possibility of malignancy should be excluded before treatment with Omeazole is instituted as treatment may alleviate symptoms and delay diagnosis.

PRECAUTION

Symptomatic response to therapy with Omeazole (omeprazole) does not preclude the presence of gastric malignancy.

SIDE EFFECTS

Omeazole is well tolerated. Nausea, diarrhoea, abdominal colic, paresthesia, dizziness and headache have been stated to be generally mild and transient and not requiring a reduction in dosage.

USE IN PREGNANCY AND LACTATION

Avoid in pregnancy unless there is no safer alternative. Breast feeding should be discontinued if the use of Omeazole is considered essential.

DRUG INTERACTION

Omeprazole can delay the elimination of diazepam, phenytoin and warfarin. Reduction of warfarin or phenytoin dose may be necessary when omeprazole is added to treatment. There is no evidence of an interaction with theophylline, propranolol or antacids.

STORAGE CONDITION

Store in a cool (below 30°C temperature) and dry place protected from light. Keep out of the reach of children.

HOW SUPPLIED

Omeazole 20 Capsule : Box containing 10 x 10 capsules in blister strip.
Omeazole 40 Capsule : Box containing 4 x 10 capsules in blister strip.



Manufactured by:
MEDIMET Pharmaceuticals Ltd.
Rupatali, Barishal, Bangladesh.